

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

Sandoz® Diltiazem T

Capsules à libération prolongée
de 120, 180, 240, 300, 360 mg de chlorhydrate de diltiazem

Antihypertenseur — antiangineux

Le présent feuillet contient des informations importantes que vous devriez savoir sur les capsules de Sandoz Diltiazem T (chlorhydrate de diltiazem).

Sandoz Diltiazem T est le nom de marque du diltiazem, en capsules à libération prolongée, à prendre 1 fois/jour. Il appartient au groupe de médicaments nommé « bloqueurs de canaux calciques » ou « antagonistes du calcium ». Votre médecin vous a prescrit Sandoz Diltiazem T, une médication qui aide à maîtriser l'hypertension artérielle et/ou les symptômes de l'angine associés à l'effort. Sandoz Diltiazem T décontracte les artères, ce qui entraîne une baisse de la pression artérielle.

Veillez lire attentivement ce feuillet. Il ne remplace pas l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien, qui peuvent vous avoir donné des instructions différentes en raison de votre état de santé individuel. L'essentiel est de suivre leurs recommandations. Pour toute question, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Avant de prendre Sandoz Diltiazem T, vous devriez informer votre médecin si :

- Vous êtes enceinte ou projetez le devenir.
- Vous allaitez.
- Vous avez actuellement des problèmes de santé ou si vous en avez eu.
- Vous prenez des médicaments, sans oublier ceux qui sont sans ordonnance. Si vous consultez plusieurs médecins, faites en sorte que chacun d'eux soit au courant de tous les médicaments que vous prenez.
- Vous êtes allergique à des substances « non médicinales », comme certains produits alimentaires, agents de conservation ou colorants, qui pourraient être présentes dans les capsules de Sandoz Diltiazem T (voir **Ingrédients de Sandoz Diltiazem T**).
- Vous avez déjà eu une réaction inhabituelle ou allergique à un médicament contenant du diltiazem.

Ingrédients de Sandoz Diltiazem T

Chlorhydrate de diltiazem, cellulose éthylique, polysorbate, eudragit, hydroxypropylméthylcellulose, stéarate de magnésium, povidone, talc, dioxyde de titane, gélatine, D&C rouge n° 28, FD&C bleu n° 1, FD&C vert n° 3, FD&C rouge n° 40, encre noir et blanc.

Comment prendre Sandoz Diltiazem T

Prenez votre Sandoz Diltiazem T **exactement** comme vous l'a prescrit votre médecin. Ne manquez pas de doses, ne prenez pas de doses supplémentaires à moins que le médecin ne vous l'ait dit. Si vous avez besoin d'un conseil, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Sandoz Diltiazem T se prend une fois/jour.
- Il est important de toujours prendre Sandoz Diltiazem T à peu près au même moment de la journée.
- Si vous manquez une dose, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien ce que vous devriez faire.
- Les capsules de Sandoz Diltiazem T ne doivent pas être croquées, ni écrasées.

Effets secondaires

Comme toute médication, Sandoz Diltiazem T peut avoir certains effets secondaires. Il est important que vous teniez votre médecin au courant de tous les effets secondaires, en particulier si l'un des effets suivants dure plus d'une semaine : céphalées, étourdissements, œdème périphérique (gonflement des chevilles), nausées (envie de vomir), bouffées congestives ou sensation de chaleur inhabituelle, battements de cœur précipités et fatigue anormale.

Discutez avec votre médecin ou avec votre pharmacien de votre expérience personnelle avec Sandoz Diltiazem T. **Ne prenez pas seul la décision d'arrêter le traitement ou de le reprendre.**

Certaines précautions devraient être observées :

- Gardez Sandoz Diltiazem T hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne donnez pas de Sandoz Diltiazem T à d'autres patients, car il pourrait ne pas leur convenir.
- Conservez ce médicament à température ambiante (15 à 30 °C) loin de l'humidité.
- Lisez soigneusement l'étiquette. Si vous avez des questions, posez-les à votre médecin ou à votre pharmacien.

® Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

SANDOZ
Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com
? 1-800-361-3062

Révisé : mars 2007
1007582 vi