

Sandoz® Naratriptan

comprimés de chlorhydrate de naratriptan

Comprimés Sandoz Naratriptan (chlorhydrate de naratriptan)

Veillez lire attentivement ce feuillet avant de commencer à prendre vos comprimés Sandoz Naratriptan. Vous y trouverez un résumé des caractéristiques de ce médicament. Ne jetez pas ce feuillet avant d'avoir fini de prendre votre médicament. Vous pourriez vouloir le consulter de nouveau. Ce feuillet ne contient pas tous les renseignements concernant les comprimés Sandoz Naratriptan. Pour de plus amples renseignements ou pour des conseils, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Renseignements sur votre médicament

Vous prenez des comprimés Sandoz Naratriptan. Sandoz Naratriptan ne peut être obtenu que sur ordonnance de votre médecin. La décision d'utiliser les comprimés Sandoz Naratriptan doit être prise de concert avec votre médecin, selon vos préférences individuelles ainsi que les circonstances médicales. La majorité des patients qui ont pris les comprimés de naratriptan n'ont pas eu d'effets secondaires importants. Cependant, les médicaments comme naratriptan ont causé de graves effets secondaires chez certains patients, en particulier chez les personnes souffrant d'une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins. Si vous avez des facteurs de risque de maladies du cœur (comme hypertension, taux élevés de cholestérol sanguin, obésité, diabète, tabagisme, antécédents familiaux importants de maladie du cœur, si vous êtes ménopausée ou si vous êtes un homme de plus de 40 ans), dites-le à votre médecin qui évaluera votre état cardiovasculaire afin de déterminer si les comprimés Sandoz Naratriptan sont appropriés dans votre cas.

1. À quoi sert votre médicament ?

Les comprimés Sandoz Naratriptan servent à soulager votre mal de tête et les autres symptômes liés aux crises de migraine. Les comprimés Sandoz Naratriptan ne devraient pas être pris de façon continue afin de prévenir les crises ou d'en diminuer le nombre. Utilisez les comprimés Sandoz Naratriptan seulement pour traiter une véritable crise migraineuse. Sandoz Naratriptan ne devrait pas être utilisé pour soulager la douleur autre que celle causée par la migraine.

2. Comment agit votre médicament ?

On croit que les maux de tête associés à la migraine seraient causés par une dilatation importante des vaisseaux sanguins dans la tête. En rétrécissant ces vaisseaux, le naratriptan soulage la douleur et les autres symptômes de la migraine.

3. Points importants à considérer avant de prendre les comprimés Sandoz Naratriptan

Si vous répondez **OUI** à l'une ou à l'autre des questions suivantes, ou si vous ne connaissez pas la réponse, parlez à votre médecin avant d'utiliser les comprimés Sandoz Naratriptan.

- Êtes-vous enceinte ? Pensez-vous que vous pourriez l'être ? Essayez-vous de le devenir ? Utilisez-vous des contraceptifs inadéquats ? Allaitiez-vous ?
- Ressentez-vous parfois une douleur ou une sensation de serrement au thorax (qui peut s'étendre ou non dans le cou, la mâchoire ou le bras) ? Souffrez-vous d'une maladie cardiovasculaire ou d'angine de poitrine ; avez-vous le souffle court ou des battements de cœur irréguliers ? Avez-vous déjà eu une crise cardiaque, un AVC (accident vasculaire cérébral) ou un AVC mineur (ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire ou AIT) ?
- Êtes-vous prédisposé à une maladie du cœur (hypertension, taux élevé de cholestérol sanguin, obésité, diabète, tabagisme, antécédents familiaux importants de maladie du cœur, femme ménopausée ou homme de plus de 40 ans) ?
- Avez-vous déjà dû cesser de prendre ce médicament ou tout autre médicament par suite d'allergie ou d'autres difficultés ?
- Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous d'épilepsie ou de convulsions ?
- Souffrez-vous d'une maladie vasculaire périphérique (par ex. une douleur à l'arrière des jambes quand vous marchez) ou avez-vous tendance à avoir les mains et les pieds froids et/ou blancs ou violacés ?
- Prenez-vous un autre médicament contre la migraine, pouvant contenir un triptan/agoniste des récepteurs 5-HT₁ ou de l'ergotamine, de la dihydroergotamine ou du méthysergide ?
- Prenez-vous des antidépresseurs de la classe des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine/norépinéphrine (IRSN) ou d'autres médicaments pour combattre la dépression ?
- Avez-vous déjà eu de la difficulté à bouger un côté de votre corps lorsque vous avez un mal de tête ?
- Avez-vous déjà eu ou souffrez-vous actuellement d'une maladie du foie ou des reins ?
- Ce mal de tête est-il différent de vos crises migraineuses habituelles ?

N'oubliez pas : si vous répondez **OUI** à l'une ou à l'autre de ces questions, parlez-en à votre médecin.

4. Qui ne devrait pas prendre Sandoz Naratriptan ?

Ne prenez pas les comprimés Sandoz Naratriptan si vous :

- êtes allergique à l'un de ses ingrédients (voir **Ce que contient votre médicament**);
- souffrez d'hypertension artérielle sévère ou non contrôlée;
- souffrez d'une maladie du cœur ou avez des antécédents de maladie cardiaque;
- souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins.

Sandoz Naratriptan ne devrait pas être pris dans les 24 heures suivant le traitement par un autre agoniste des récepteurs 5-HT₁ comme le sumatriptan, le rizatriptan, le zolmitriptan ou l'almotriptan ou un médicament de type ergotamine comme l'ergotamine, la dihydroergotamine ou le méthysergide.

5. Utilisation des comprimés Sandoz Naratriptan pendant la grossesse

N'utilisez pas les comprimés Sandoz Naratriptan si vous êtes enceinte, si vous pensez que vous pourriez l'être, si vous essayez de le devenir ou si vous n'utilisez pas des contraceptifs adéquats, à moins que vous en ayez parlé à votre médecin.

6. Comment prendre les comprimés Sandoz Naratriptan

Pour les adultes, la dose habituelle est d'un seul comprimé à 2,5 mg (selon les directives de votre médecin), pris entier, avec des liquides. On devrait le prendre dès le début de la migraine, mais on peut le prendre à n'importe quel moment après l'apparition du mal de tête. Un autre comprimé peut être utilisé si votre mal de tête revient ou si vous avez besoin d'un plus grand soulagement, mais ne le prenez qu'au moins 4 heures après le premier comprimé. Lors d'une crise, si vous ne ressentez aucun effet après le premier comprimé, n'en prenez pas un autre pour la même crise sans en parler d'abord à votre médecin. Ne prenez pas plus de 5 mg du médicament en 24 heures. Sandoz Naratriptan ne devrait pas être pris tous les jours pour tenter de prévenir une migraine. Si vous avez une maladie des reins ou du foie, suivez les directives de votre médecin.

Si vous prenez d'autres médicaments contre la migraine, parlez-en à votre médecin avant de prendre Sandoz Naratriptan.

7. Effets secondaires à surveiller

Bien que la plupart des patients qui ont pris des comprimés Sandoz Naratriptan n'ont pas ressenti d'effets secondaires importants, des personnes ont cependant éprouvé certaines difficultés.

- **Certains patients ressentent une sensation de douleur, de pression ou de serrement dans la poitrine, le cou, la gorge, la mâchoire ou les bras lorsqu'ils utilisent les comprimés Sandoz Naratriptan.** Si cela se produit, parlez-en à votre médecin avant de prendre d'autres comprimés Sandoz Naratriptan. Si la douleur à la poitrine est intense (douleur pouvant ressembler à de l'angine de poitrine) ou ne disparaît pas, appelez immédiatement votre médecin.
- Étant donné qu'une somnolence peut se produire, ne conduisez pas de véhicule ou ne manœuvrez pas de machines tant que vous n'êtes pas certain de ne ressentir aucune somnolence.
- Dans de rares cas, l'essoufflement, la respiration sifflante, l'enflure des paupières, du visage ou des lèvres, les éruptions ou les boursoffures de la peau ou l'urticaire peuvent se produire. Dans de tels cas, parlez-en immédiatement à votre médecin. Ne prenez pas d'autres comprimés Sandoz Naratriptan à moins que votre médecin vous dise de le faire.
- Quelques personnes peuvent ressentir des picotements, de la chaleur, des bouffées congestives (rougeur du visage durant un court laps de temps), une lourdeur ou une pression, de la fatigue ou des étourdissements après le traitement à l'aide des comprimés Sandoz Naratriptan. Si vous avez l'un ou l'autre de ces symptômes, parlez-en à votre médecin.
- Si vous ressentez des douleurs abdominales soudaines ou intenses après avoir pris les comprimés Sandoz Naratriptan, téléphonez à votre médecin immédiatement ou présentez-vous à l'urgence.
- Comme les médicaments contre la migraine peuvent causer une réduction de la circulation sanguine dans les membres (connue sous les noms de vasospasme ou ischémie), un petit nombre de personnes prenant ces médicaments pourraient ressentir un engourdissement, une sensation de picotement, une sensation de froid ou une douleur dans les mains et les pieds, ou avoir les mains et les pieds pâles ou violacés. Si vous présentez n'importe lequel de ces symptômes, s'ils persistent ou s'aggravent, vous devriez cesser de prendre le médicament et consultez votre médecin sans délai.
- Si vous ne vous sentez pas bien de quelque autre façon que ce soit, ou si vous avez des symptômes que vous ne comprenez pas, vous devriez communiquer immédiatement avec votre médecin.

- Si vous prenez trop souvent Sandoz Naratriptan, cela pourrait aggraver vos maux de tête. Si c'est le cas, votre médecin pourrait vous demander d'arrêter de prendre Sandoz Naratriptan.

8. Que faire en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de médicaments que votre médecin ne vous l'a conseillé, appelez immédiatement votre médecin, l'urgence d'un hôpital ou le centre anti-poison le plus proche.

9. Conservation de votre médicament

Conservez votre médicament dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ce médicament peut être dangereux pour les enfants.

Votre médicament devrait être conservé entre 15 et 30 °C, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Si la date d'utilisation de votre médicament est dépassée (cette date est imprimée sur l'emballage), jetez le médicament.

Si votre médecin décide de cesser le traitement, ne gardez pas les comprimés qui restent à moins que le médecin vous dise de le faire.

10. Ce que contient votre médicament :

Chaque comprimé Sandoz Naratriptan renferme 2,5 mg de naratriptan base sous forme de chlorhydrate. Il contient aussi les ingrédients non médicinaux suivants : laque d'aluminium FD&C bleu n° 2, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hypromellose, oxyde ferrique jaune, lactose anhydre, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, triacétine.

11. Classe du médicament

Ce médicament appartient au groupe des antimigraineux.

12. Qui fabrique votre médicament ?

Sandoz Naratriptan est fabriqué pour Sandoz Canada Inc.

13. Rappel

N'OUBLIEZ JAMAIS que ce médicament vous est destiné. Seul un médecin peut vous le prescrire. N'en donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si ses symptômes ressemblent aux vôtres, car ce médicament peut lui être nuisible.

© Marque de commerce déposée utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.



Sandoz Canada Inc.
Ottawa, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

1-800-361-3062

Révisé : octobre 2010

1007010 vi